

روزهای دوم و سوم بعد از تزریق، در صورت ادامه تب قطره استامینوفن هر 6 ساعت یکبار دوبرابر وزن کودک داده می شود.



در روز اول بعد تزریق به منظور کاهش تورم و درد، از کمپرس سرد و در روز دوم و سوم از کمپرس گرم استفاده شود.

روز اول بعد تزریق، در صورت بروز تب و بی قراری، قطره استامینوفن هر 4 ساعت یکبار معادل دو برابر وزن کودک داده می شود.

واکسن های پنج گانه و سه گانه

7-10 روز بعد تزریق واکسن، ممکن است علائم سرماخوردگی و بثورات جلدی (دانه های قرمز رنگ) مشاهده شود.

1. اگر محل تزریق قرمز شد نگران نباشید.
2. لباس های نخی و آزاد به نوزاد بپوشانید
3. بعد از تزریق نوزاد دچار تب نمی گردد اما ممکن است تب خفیفی روی دهد.
4. زخم را دستکاری نکنید و اجازه دهید روال بهبود طبیعی را طی کند
5. اگر جای تزریق باقی نماند، نیازی به تزریق مجدد نیست

واکسن MMR واکسن ب ث ژ

گردآورندگان :
فاطمه رحمنی
شقایق زندیان
فاطمه دادگری
هستی مرادی
فاطمه زارعی
مبینا محرابی
فاطمه آقاخان بیگی
زهرا ارمندپیشه

استاد مربوطه:
سرکار خانم لیلا دهقانکار

پاییز 99

