

عنوان : تعیین میزان بروز افسردگی در مصرف کنندگان فیناستراید در مبتلایان به الوپسی اندروژنتیک

چکیده

سابقه و هدف

آلופسی اندروژنتیک شایع ترین شکل ریزش مو در مردان است که تا ۵۰ سالگی، ۳۰ تا ۵۰ درصد مردان را تحت تأثیر قرار می دهد. فیناستراید مهار کننده رقابتی آنزیم ۵-آلفا ردوکتاز است و برای درمان آلوپسی اندروژنتیک استفاده می شود. برخی مطالعات نشان داده اند که فیناستراید ممکن است تغییرات رفتاری و افسردگی ایجاد کند. هدف از این مطالعه تعیین میزان بروز افسردگی در مبتلایان به الوپسی اندروژنتیک در مصرف کنندگان فیناستراید است .

روش بررسی

این پژوهش در کلینیک های تخصصی پوست قزوین انجام شد. صد و بیست و شش مرد مبتلا به آلوپسی اندروژنتیک که برایشان فیناستراید (۱ میلی گرم در روز) تجویز شد در این مطالعه وارد شدند. توسط پرسشنامه افسردگی بک (BDI II) میزان افسردگی مراجعین، گرفته شد. شرکت کنندگان پرسشنامه BDI II را قبل از شروع درمان و سه ماه بعد از درمان تکمیل کردند.

یافته ها

سن افراد مورد مطالعه بین ۱۸-۴۶ سال و ۶۰,۳ درصد آنها ۲۰ تا ۳۰ سال بود. در ابتدای ورود به مطالعه، نمرات افسردگی BDI ۸۱,۷% (۱۰۳ مورد) در محدوده طبیعی قرار داشتند. پس از درمان، ۵۳,۲% (۶۷ مورد) در محدوده طبیعی باقی ماندند و ۴۶,۷% افسردگی خفیف تا متوسط داشتند. درمان با فیناستراید ارتباط معنی دار با افزایش میزان افسردگی شد. ($p < 0,05$)

بحث و نتیجه گیری

این مطالعه نشان می دهد که فیناستراید ممکن است باعث علائم افسردگی شود. به نظر می رسد مطالعات بیشتری برای تعیین اثرات رفتاری و روانی این دارو در دوزهای بالاتر و برای دوره طولانی تر ضروری است.

کلیدواژگان: فیناستراید، افسردگی، آلوپسی اندروژنتیک،

